原发性阴道恶性黑色素瘤 12 例临床病理分析

Primary Malignant Melanoma of the Vaginal: A Clinicopathological Analysis of 12 Cases
WU Xiao-hui, ZHANG Zhong

吴晓辉¹, 张 众²

(1. 大连医科大学附属第二医院北院区, 辽宁 大连 116031;

2. 大连医科大学基础医学院, 辽宁 大连 116027)

摘要: [目的] 探讨原发性阴道恶性黑色素瘤的临床病理学特征。[方法] 应用免疫组化 SP 法检测 S-100、HMB-45、MART-1 及 tyrosinase 在 12 例原发性阴道恶性黑色素瘤中的表达情况。[结果] 12 例原发性阴道恶性黑色素瘤中, S-100 阳性表达率为 91.7% (11/12), 敏感性最高, MART-1、tyrosinase 和 HMB-45 的阳性表达率分别为 75.0% (9/12)、75.0% (9/12) 和 66.7% (8/12)。1 例 I 期患者局部切除后复发, 再行根治手术和术后辅助化、放疗后无瘤生存 42 个月, 11 例 II~IV 期患者中, 除 1 例经根治手术联合放、化疗后生存 14 个月, 余 10 例均死亡, 中位生存时间为 22 个月。[结论] 原发于阴道的恶性黑色素瘤罕见, 明确诊断需依赖病理形态学及免疫组化标记。该肿瘤侵袭性强, 预后差, 至今尚未形成统一模式的治疗方法。

关键词: 阴道肿瘤; 黑色素瘤; 免疫组化; 预后

中图分类号: R739.5 **文献标识码:** A **文章编号:** 1671-170X(2012)08-0608-04

恶性黑色素瘤是临床少见的起源于黑色素细胞的高度恶性肿瘤, 占有恶性肿瘤的 1%~3%^[1], 原发于阴道的恶性黑色素瘤更为罕见, 发病率为 0.046/10 万^[2], 约占恶性黑色素瘤的 0.3%~0.8%, 占女性生殖系统恶性肿瘤的 2%~5%^[3]。由于肿瘤预后差, 患者生存期短, 临床医师对该疾病认识尚不充分, 至今未形成统一模式的治疗方法。本文收集了 12 例原发性阴道恶性黑色素瘤的临床病理资料进行回顾性分析, 结合文献探讨其组织病理形态、免疫表型、治疗及预后特点, 旨在加深病理和临床医师对该罕见病变的认识。

1 资料与方法

1.1 临床资料

收集大连医科大学附属第二医院北院区病理科 1990 年至 2010 年间资料完整且病理诊断明确的原发性阴道恶性黑色素瘤 12 例, 占同期收治妇

科肿瘤的 0.2%, 占原发性阴道恶性肿瘤的 4%。患者年龄 44~80 岁, 中位年龄 61 岁, 其中 2 例为绝经前妇女。临床症状表现为阴道出血、排液及肿物。病灶位于阴道下 1/3 者 8 例, 中上 1/3 者 3 例, 全阴道者 1 例。按阴道癌 FIGO 分期: I 期 6 例, III 期 3 例, IV 期 3 例。

1.2 免疫组化

免疫组化采用 SP 法, 实验过程严格按试剂盒说明书操作。S-100、HMB-45、MART-1 和 tyrosinase 均购自福州迈新公司。

1.3 结果判定

S-100 阳性定位于细胞核/质, HMB-45、MART-1 及 tyrosinase 均定位于细胞质。不同抗体定位区呈棕黄色为阳性; 无色、染色浅与背景几乎一致及高倍视野下阳性细胞占同类细胞的 5% 以下为阴性。

2 结果

2.1 病理检查

巨检: 肿物呈结节状、息肉样或不规则斑片状, 表面呈灰白或灰黑色, 可见坏死或溃疡形成。切面

通讯作者: 吴晓辉, 主治医师, 硕士; 大连医科大学附属二院北院区病理科, 辽宁省大连市甘井子区山中街 216 号 (116031);
E-mail: songwywu@hotmail.com。

收稿日期: 2012-05-16; **修回日期:** 2012-06-26

呈灰白、灰褐或深黑色,病灶直径0.6~5.6cm,厚度0.7~4.5cm,界限不清,质嫩,部分病例伴有出血及坏死。

镜检:肿瘤细胞多形性明显,可见上皮样、梭形细胞及多核瘤细胞,以上皮样细胞为主,几种细胞可混合存在(图1A)。肿瘤细胞呈巢状或弥漫片状分布,黏附松散,部分病例可见肿瘤与表面上皮的连续性过渡(图1B)。细胞异型性明显,核浆比增大、形态和大小不一,常见核仁及核分裂相,胞质丰富,呈轻度嗜酸性,可含有多少不等的黑色素颗粒或细粉尘状黑色素。

2.2 免疫表型

10例原发性阴道恶性黑色素瘤 S-100 弥漫强

阳性,1例散在阳性,阳性表达率为91.7%,敏感性最高;9例 MART-1 和 tyrosinase 弥漫强阳性,阳性表达率均为75.0%;7例 HMB-45 弥漫强阳性,1例散在和灶状阳性,阳性表达率为66.7%。见图2。在2例梭形细胞型中,S-100 呈阳性表达,MART-1 和 HMB-45 均为阴性表达。淋巴瘤标记 CD20、CD79 α 、CD3、CD5、CD30、MPO、TDT,上皮性标记 AE1/AE3、HCK、LCK 及间叶源性肿瘤标记 SMA、desmin、CD34 均呈阴性表达。

2.3 治疗及预后

以美国癌症联合委员会(American Joint Committee on Cancer, AJCC)最新版(2009)黑色素瘤分期标准重新分析本组初发病例, I 期至IV期者分别为1例、5例、3例、3例,其中1例 I 期患者术后23个月局部复发,再经根治手术及放化疗后无癌生存42个月,另1例 III 期患者根治手术联合放、化疗后生存14个月,余10例死亡,中位生存时间为22个月。12例患者中7例复发和(或)转移,复发部位均为阴道,时间4~43个月不等,转移者以肺为主,均于治疗后1年内死亡。

3 讨论

黑色素瘤是起源于神经嵴的弥散神经内分泌细胞的恶性肿瘤,好发于皮肤,发生于阴道黏膜者罕见。文献报道约3%成年女性阴道上皮基底层存在黑色素细胞,有学者认为其来源于胚胎期神经嵴黑色素母细胞,在胚胎发育过程中迁徙至女性生殖系统,从而为黑色素瘤的发生提供了组织学基础^[4]。肿瘤多见于60~70岁绝经后老年女性。好发于阴道下1/3(占58%)和阴道前壁(占45%)^[5],临床症状缺乏特异性,主要表现为阴道不规

图1 肿瘤细胞镜下观察

图2 免疫组化结果(SP法)

则流血、溢液及肿块,临床上需与子宫内膜异位结节、陈旧性血肿、息肉伴出血及子宫绒癌转移结节相鉴别。原发性阴道恶性黑色素瘤生长迅速,侵袭性强,易血行扩散,短期内可发生远处转移。

目前,皮肤黑色素瘤组织学分类的核心是放射(水平)生长期和垂直(侵袭)生长期的概念。据文献报道阴道恶性黑色素瘤以结节性为主^[6],此临床病理亚型不经放射生长期阶段直接处于垂直生长期,大多数肿瘤被切除时瘤体已经较厚,因此相对于皮肤和外阴黑色素瘤,阴道恶性黑色素瘤的预后更差。肿瘤细胞类型以上皮样细胞型为主(55%~58%)^[6,7],也可形成其他类型如梭形细胞、似痣细胞的小上皮细胞,单核或多核巨细胞为主要成分或各种类型相互混合。本研究报道的12例阴道恶性黑色素瘤中,8例为上皮样细胞型,梭形细胞型2例,混合型2例。上皮细胞型肿瘤细胞体积较大,呈巢状、腺泡样或弥漫片状分布,黏附松散,间质较少,细胞异型性明显,核/浆比增大、胞质丰富,呈嗜酸、嗜碱、泡沫状、印戒样或透明,常见大的嗜酸性核仁及核分裂相,黑色素可丰富、稀少或缺如。梭形细胞型肿瘤细胞呈席纹状或束状排列,细胞胞体狭长,核常为空泡状,缺乏明显核仁,见少量嗜酸性胞质。混合型者两种组织形态并存。肿瘤间质内显示不同程度淋巴细胞、单核细胞浸润,可伴有纤维化、毛细血管扩张及嗜色素细胞形成。

恶性黑色素瘤以镜下表现千变万化著称,可与多种形态相似的肿瘤混淆,对疑为黑色素瘤的病例应结合组织学形态采用多种标志物联合检测。S-100在94%~100%的原发和转移性恶性黑色素瘤中呈不同程度的阳性表达,是诊断恶性黑色素瘤的最为敏感的指标之一^[8,9],但其同时表达于神经胶质细胞、软骨细胞、组织细胞、脂肪细胞及其相应肿瘤的衍生细胞成分,故特异性较差。HMB-45表达于80%~86%的转移性恶性黑色素瘤和90%~100%的原发恶性黑色素瘤中^[8,10],其特异性更强,敏感性较差。MART-1在上皮样细胞型黑色素瘤中的敏感性与S-100相近,在梭形细胞型恶性黑色素瘤中的敏感性较差。另有研究表明,MART-1表达的降低与肿瘤厚度的增加、无瘤生存期的减少及患者的死亡率增加有关^[11]。tyrosinase是黑色素小体中的I型膜蛋白,皮肤黑色素瘤中的阳性表达率为94%^[12],在口

腔黑色素瘤中敏感性与S-100相近,是诊断鼻窦黏膜黑色素瘤最敏感的指标^[13]。Gupta等^[6]报道的26例阴道恶性黑色素瘤中,S-100、MART-1、tyrosinase和HMB-45的阳性表达率分别为96%、81%、81%和73%。本研究中S-100阳性表达率为91.7%,敏感性最高,MART-1、tyrosinase和HMB-45的阳性表达率分别为75.0%、75.0%和66.7%。在2例梭形细胞型中,S-100呈阳性表达,MART-1和HMB-45均为阴性表达,与文献报道基本一致。

文献报道阴道黑色素瘤中约10%~23%为无色素型^[7],对于少色素性或无色素性的病例,应仔细寻找色素及上皮内具“交界活性”特征的病变,以明确肿瘤起源部位,并借助免疫组化方法加以鉴别,避免造成临床及病理误诊:①低分化癌:当癌分化程度很低时于形态学上需与上皮样细胞型黑色素瘤鉴别,癌上皮性标记AE1/AE3、HCK、LCK阳性,黑色素瘤S-100、MART-1、tyrosinase和HMB-45阳性。②肉瘤:无色素的梭形细胞型恶性黑色素瘤可能与肉瘤相混淆,如骨肉瘤尤文氏肉瘤(Ewing sarcoma)/原始神经外胚瘤(primitive neuroectodermal tumor, PNET)及生殖器官横纹肌肉瘤等,除特征性的形态学改变外,Ewing肉瘤CD99阳性,生殖系统横纹肌肉瘤desmin和Myoglobin阳性,HMB-45和MART-1为阴性。③淋巴瘤:恶性黑色素瘤细胞呈单一性弥漫性生长时,需与淋巴瘤鉴别,非霍奇金淋巴瘤CD20或CD45RO阳性,霍奇金淋巴瘤CD15和CD30阳性。④“交界性”黑色素细胞病变与恶性黑色素瘤的组织学表现常难以区别。轮廓的不对称性,光镜下缺乏细胞成熟现象,核的高度不典型性及较多核分裂相,均提示恶性黑色素瘤。

阴道恶性黑色素瘤侵袭性强、预后差,目前主要采用手术、放疗、化疗及免疫治疗等综合疗法。5年生存率仅为5%~25%^[14]。Frumovitz等^[15]报道的37例I期患者中位生存时间为19.1个月,89.2%(33/37)的原发肿瘤在发现17.4个月后即复发或发生远处转移。AJCC 2009年修订的最新版黑色素瘤分期标准将肿瘤厚度、有丝分裂数及溃疡的形成列为影响预后的最重要因素^[16]。新版分期标准中Breslow厚度分界值界定为1mm、2mm和4mm,研究显示T₁~T₄期恶性黑色素瘤患者的10年生存率分别为92%、80%、63%及50%^[16];T_{1a}期恶性黑色素瘤(无溃疡形

成,有丝分裂数 $<1/\text{mm}^2$ 的10年生存率为95%, T_{1b} 期恶性黑色素瘤(无溃疡形成,有丝分裂数 $\geq 1/\text{mm}^2$)的10年生存率降至88%。本文12例患者,2例无病生存至今,余10例死亡,中位生存时间为22个月。12例患者中7例复发和(或)转移,复发部位均为阴道,时间4~43个月不等,转移者以肺为主,均于治疗后1年内死亡。

因阴道恶性黑色素瘤预后极差,为了提高患者的治愈率和生存率,需早期发现和及时治疗,其最佳治疗方案的制定还需更多临床病例总结积累经验并加以完善。

参考文献:

- [1] Jaroszewski DE, Pockaj BA, DiCaudo DJ, et al. The clinical behavior of desmoplastic melanoma[J]. *Am J Surg*, 2001, 182(6):590-595.
- [2] Hu DN, Yu GP, McCormick SA. Population-based incidence of vulvar and vaginal melanoma in various races and ethnic groups with comparisons to other site-specific melanomas[J]. *Melanoma Res*, 2010, 20(2):153-158.
- [3] Samolis S, Panagopoulos P, Kanellopoulos N, et al. Primary malignant melanoma of the vagina: a case report [J]. *Eur J Gynaecol Oncol*, 2010, 31(2):233-234.
- [4] Irvin WP Jr, Bliss SA, Rice LW, et al. Malignant melanoma of the vagina and locoregional control: radical surgery revisited[J]. *Gynecol Oncol*, 1998, 71(3):476-480.
- [5] Gungor T, Altinkaya SO, Ozat M, et al. Primary malignant melanoma of the female genital tract [J]. *Taiwan J Obstet Gynecol*, 2009, 48(2):169-175.
- [6] Gupta D, Malpica A, Deavers MT, et al. Vaginal melanoma: a clinicopathologic and immunohistochemical study of 26 cases[J]. *Am J Surg Pathol*, 2002, 26(11):1450-1457.
- [7] Miner TJ, Delgado R, Zeisler J, et al. Primary vaginal melanoma: a critical analysis of therapy[J]. *Ann Surg Oncol*, 2004, 11(1):34-39.
- [8] Banerjee SS, Harris M. Morphological and immunophenotypic variations in malignant melanoma[J]. *Histopathology*, 2000, 36(5):387-402.
- [9] Bishop PW, Menasce LP, Yates AJ, et al. An immunophenotypic survey of malignant melanomas[J]. *Histopathology*, 1993, 23(2):159-166.
- [10] Miettinen M, Fernandez M, Franssila K, et al. Microphthalmia transcription factor in the immunohistochemical diagnosis of metastatic melanoma: comparison with four other melanoma markers[J]. *Am J Surg Pathol*, 2001, 25(2):205-211.
- [11] Berset M, Cerottini JP, Guggisberg D, et al. Expression of Melan-A/MART-1 antigen as a prognostic factor in primary cutaneous melanoma[J]. *Int J Cancer*, 2001, 95(1):73-77.
- [12] Hofbauer GF, Kamarashev J, Geertsen R, et al. Tyrosinase immunoreactivity in formalin-fixed, paraffin-embedded primary and metastatic melanoma: frequency and distribution[J]. *J Cutan Pathol*, 1998, 25(4):204-209.
- [13] Prasad ML, Jungbluth AA, Iversen K, et al. Expression of melanocytic differentiation markers in malignant melanomas of the oral and sinonasal mucosa[J]. *Am J Surg Pathol*, 2001, 25(6):782-787.
- [14] Piura B. Management of primary melanoma of the female urogenital tract[J]. *Lancet Oncol*, 2008, 9(10):973-981.
- [15] Frumovitz M, Etchepareborda M, Sun CC, et al. Primary malignant melanoma of the vagina [J]. *Obstet Gynecol*, 2010, 116(6):1358-1365.
- [16] Balch CM, Gershenwald JE, Soong SJ, et al. Final version of 2009 AJCC melanoma staging and classification [J]. *J Clin Oncol*, 2009, 27(36):6199-6206.