食管癌血清差异表达蛋白图谱和诊断模型的建立

Establishment of Serum Differential Expression Protein Map and Diagnostic Model for Esophageal Cancer // ZHANG Xu, SHAO Qian-wen, ZHOU Xiao-ning

张旭¹, 邵倩雯², 周小宁³

(1. 盐城师范学院药学院, 江苏 盐城 224002; 2. 南京医科大学第一附属医院, 江苏 南京 210029; 3. 盐城市第一人民医院, 江苏 盐城 224006)

摘要: [目的] 比较食管癌患者和健康人的血清差异表达蛋白图谱, 建立食管癌诊断模型。 [方法] 收集 38 食管癌患者血清和 40 健康人血清, 用表面增强激光解析电离飞行时间质谱 (SELDI-TOF-MS) 技术检测血清蛋白表达, 并用 ProteinChip Software、Biomarker Patterns Software 和 SPSS16.0 软件分析和筛选差异蛋白。 [结果] 在 1kDa~10kDa 范围内, 得到差异蛋白 144 个 ($P < 0.05$), 用荷质比为 M/Z 8926.478、8136.185 和 4476.086 的峰 ($P < 0.000001$) 作为食管癌的诊断模型, 其灵敏度为 95.0%, 特异度为 97.5%, 准确率为 97.5%, 阳性预测值为 100%, 阴性预测值为 95.2%, ROC 曲线下面积 (AUC) 为 97.5%, 对食管癌诊断效率最大时的界值 (cut-off 值) 为 2.5%。 [结论] SELDI-TOF-MS 技术可以准确筛选食管癌血清差异表达蛋白, 建立的诊断模型准确性高, 特异性好。

关键词: 食管肿瘤; SELDI-TOFMS; 差异表达蛋白; 诊断模型

中图分类号: R735.1 **文献标识码:** B **文章编号:** 1671-170X(2018)10-1022-04

doi: 10.11735/j.issn.1671-170X.2018.10.B017

食管癌的早期症状不明显, 绝大部分食管癌患者确诊时已是中晚期, 且术后 5 年生存率约为 10%^[1]。因而, 确立食管癌诊断标志物, 做到食管癌的早诊断非常必要^[2]。目前已知的食管癌标志物有鳞状上皮细胞癌相关抗原 (SCC)、神经元特异性烯醇化酶 (NSE)、癌胚抗原 (CEA)、细胞角蛋白 19 片段抗原 (CYFRA21-1)、p53 蛋白以及 p53 蛋白抗体 (p53-Ab)^[3]; 但是, 上述指标诊断灵敏度、特异性均较低, 如 CEA 的灵敏度约 14%, SCC 的灵敏度 26.8%~50.0%, CYFRA21-1 的灵敏度 43.0%~76.9%, p53-Ab 的灵敏度 28%~60%, 单独应用于食管癌的诊断价值不大, 联合诊断可提高灵敏度至 83% 左右, 但仍小于 90%^[4]。因此, 寻找高灵敏度、高特异性的食管癌诊断标志物是目前研究、应用的目标之一。本研究利用表面增强激光解析电离飞行时间质谱 (SELDI-TOF-MS) 分析食管癌患者和健康人血清蛋白指纹图谱^[5], 确定食管癌的诊断标志物, 并建立食管癌诊断模型。

基金项目: 江苏省人力资源和保障厅资助项目 (swyy-030)

通讯作者: 周小宁, 副主任医师, 硕士; 盐城市第一人民医院肿瘤科, 江苏省盐城市亭湖区毓龙西路 166 号 (224006); E-mail: yczxn@qq.com

收稿日期: 2017-06-25; **修回日期:** 2018-03-20

1 材料与方法

1.1 一般材料

选取 2014 年 9 月至 2015 年 9 月在盐城市第一人民医院治疗的 38 例食管癌患者作为观察组, 化疗前血常规、肝肾功能、心电图均正常, 无化疗禁忌证, 所有患者予 TCF 方案化疗, 即紫杉醇 (生产单位: 亚宝药业集团股份有限公司, 批准文号: 国药准字 H20084099, 2008-09-12) 135mg/m² 静脉点滴, 第 1d; 顺铂 (生产单位: 山东凤凰制药股份有限公司, 批准文号: 国药准字 H20056422, 2010-09-30) 20mg/m² 静脉点滴, 第 1~5d; 氟尿嘧啶 (生产单位: 上海通用药业股份有限公司, 批准文号: 国药准字 H31021276, 2002-09-13) 500mg/m² 静脉点滴, 第 1~5d; 2 周期后复查食管癌血清肿瘤标志物的变化。38 例患者中男性 21 例, 女性 17 例; 年龄 36~68 岁, 平均年龄 57.6±4.3 岁; III 期 14 例, IV 期 24 例; 肝转移 19 例, 肺转移 23 例, 骨转移 17 例; Karnofsky 评分 ≥ 70 分。将在南京医科大学第一附属医院体检的 40 名健康者列为对照组, 男性 26 例, 女性 14 例, 年龄

37~65岁,平均年龄 55.4±5.1岁,排除心、肺不全和肿瘤、精神类疾病;均签署知情同意书,两组性别、年龄等一般资料差异无统计学意义 ($P>0.05$),有可比性。

1.1.1 主要试剂

CM10 蛋白芯片购自 Biorad 公司,乙腈(HPLC级)、三氟乙酸(TFA)、无水醋酸钠(NaAc)、3-[3-(胆酰氨基丙基)二甲氨基]丙磺酸内盐(CHAPS)、Tris 碱、氯化氢(HCl)、去离子水(HPLC)、氢氧化钠(NaOH)、羟乙基哌嗪乙磺酸(HEPES)和二巯基苏糖醇(DTT)均购自 Sigma 公司。

1.1.2 主要仪器

PBSIIC 型蛋白质芯片飞行时间质谱仪(SELDI-TOF-MS)出自于 CIPHERGEN 公司。

1.1.3 主要软件

ProteinChip Software 和 Biomarker Patterns Software 来自 Biorad 公司;SPSS16.0 来自 SPSS 公司。

1.2 方法

1.2.1 血清样品采集

两组血清的采集均是清晨空腹、无抗凝剂的 5ml 采血试管, -80℃低温保存,采集时间从 2014 年 11 月至 2015 年 5 月份;加样枪枪头 P20、P200、P1000 以及 0.5ml、1.5ml 微型离心管均购自于 AXYGENT 公司。

1.2.2 血清样品处理

将血清样品从 -80℃冰箱中取出,放在冰上解冻,待血清完全融化,放入 4℃离心机以 10 000rpm 的速率离心 2min;将血清用 2 倍体积的 U9 反冲液稀释,放置在冰上震荡 30min;将 9μl 上述变性后的样品加入 108μl 50mM NaAc(pH4.0)的结合反冲液,快速混匀,并将上述血清样品上样到芯片上,用 PBSIIC 型蛋白质芯片飞行时间质谱仪读取芯片信息,得到质谱图原始数据,Biomarker Wizard Software 把图形数据按标准化格式导出成为数字格式 EXCEL

进行统计分析。

1.3 统计学处理

采用 SPSS16.0 软件进行统计学分析,各组计量资料以 $\bar{x}\pm s$ 表示,采用 t 检验;运用 ROC 曲线对检测结果进行分析,确定其 cut-off 值。 $P<0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 食管癌患者和健康人血清蛋白图谱

在分子量为 1kDa~10kDa 范围内,食管癌患者血清共检测到 253 个蛋白峰,与健康人血清差异有统计学意义的共 144 个 ($P<0.05$),与健康人(对照组)相比,食管癌患者有 56 个蛋白高表达,88 个蛋白低表达。见 Figure 1。

Figure 1 The protein peak graph of the esophageal carcinoma patients and healthy people

2.2 诊断模型的建立

为了便于建立诊断模型,从与对照组的差异具有统计学意义的蛋白峰中,选取 $P<0.000001$ 的荷质比峰值,共有 7 个(Table 1)。为了消除系统误差,在这 7 个峰值中,挑选出信噪比较好(峰高大于 2)的 3 个峰作为最具有潜在诊断价值的标志蛋白,它们是荷质比分别为 4476.086 ($P=8.52\times 10^{-7}$)、8136.185 ($P=6.45\times 10^{-7}$)以及 8926.478 ($P=7.33\times 10^{-8}$),这 3 个蛋白峰在食管癌患者中相对于健康组均高表达(Table 1)。用这 3 个蛋白质峰建立食管癌的诊断模型,该诊断模型的灵敏度为 95.0%,特异度为 97.5%,准确率

Table 1 The different differential protein peaks in the two groups

Groups	n	Differential protein peak / abundance						
		2748.873	4119.315	4425.942	4476.086	4798.629	8136.185	8926.478
Observation group	38	1.261±0.32	0.142±0.04	0.873±0.14	17.109±3.15	2.322±0.75	29.258±4.32	46.006±5.47
Control group	40	8.841±1.24	17.258±2.45	6.452±1.32	3.466±0.68	15.062±3.12	4.613±1.02	10.208±2.15
t	-	36.53	43.05	25.91	26.75	24.50	35.08	38.40
P	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001

为 97.5%,阳性预测值为 100%,阴性预测值为 95.2%,ROC 曲线下面积 (AUC) 为 97.5%,对食管癌诊断效率最大时的界值 (cut-off 值) 为 2.5%。见 Figure 2。

2.3 诊断模型的 3 个标志蛋白在治疗前、治疗后以及健康人的比较

3 个标志蛋白在食管癌患者中均高表达,有 2 个蛋白的表达在治疗后降低,M/Z 4476.08 的丰度由治疗前的 33.31386 降到治疗后的 18.592 (健康人的平均值为 3.4664),M/Z 8926.478 的丰度由治疗前的 60.68546 降到治疗后的 43.39402 (健康人的平均值为 6.8052),而 M/Z 8136.185 的丰度由治疗前的 37.34336 经治疗反而升高到 53.97962 (健康人的平均值为 4.6130)。见 Table 2。

3 讨论

我国食管癌发病占世界 50% 以上^[6],我国食管癌病例主要集中在六大区域,其中苏北地区(淮安和盐城区域)是六大食管癌高发区之一(死亡率 110/10 万)^[7]。男性患者居多,男女比例为 1.6:1;农村高于城市,比例为 3:1^[8]。发病年龄多在 50~69 之间,约占患者的 60%;苏北地区发病率高于全国最低的云南 30 倍。早期食管癌患者经治疗,其 5 年生存率高达 90% 以上。因而,食管癌如能做到早诊断,早治疗,能大大提高患者的生存率^[9]。

表面增强激光解析电离飞行时间质谱(SELDI-TOF-MS)技术被广泛地应用于癌症血清蛋白的筛选^[10],如乳腺癌^[11]、卵巢癌、原发性肝癌、原发性结肠癌、宫颈癌^[12]、食管癌等,以及建立诊断模型^[13]。

我们应用表面增强激光解析电离飞行时间质谱(SELDI-TOF-MS)技术检测 38 例食管癌患者的血清和 40 名健康人血清,结果显示具有统计学意义的差异表达蛋白共有 144 个($P < 0.05$),并筛选 8926.478、8136.185 和 4476.086 ($P < 0.000001$) 3 个质谱峰建立食管癌的诊断模型。该诊断模型对于食管癌患者的灵敏度和特异性分别为 95.0% 和 97.5%,对于健康人的灵敏度和特异性分别为 100% 和 97.5%,阳性预

Figure 2 ROC curve of the diagnostic model for esophageal cancer and health control group

Table 2 Comparison of the 3 markers of the diagnostic model before and after treatment

Groups	n	Differential protein peak / abundance		
		4476.08	8136.185	8926.478
Observation group				
Before treatment	38	33.314±4.26*	37.343±4.12*	60.685±6.37*
After treatment	38	18.593±3.16*	53.979±5.37*	43.394±5.46*
Control group	40	3.466±0.68	4.613±1.02	10.208±2.15

Note: *; compared with the control group, $P < 0.0001$

测值为 100%,阴性预测值为 95.2%,ROC 曲线下面积(AUC 值)为 97.5%,对食管癌诊断效率最大时的界值 (cut-off 值) 为 2.5%。对比 Zheng 等^[14]研究,他们用荷质比为 9368.63、5342.59 和 5254.43 的蛋白峰作为诊断模型,也取得非常好的诊断效果,峰值与本研究有差异,一是他们采用了不一样的芯片,另外,可能研究条件也有所差异。刘茶珍等^[15]应用 WCX2 芯片自动选择 M/Z 为 2545、3371、3746、5009、5021 和 15886 的 6 个差异蛋白峰作为诊断模型,但灵敏度和特异性均不理想。

综上所述,SELDI-TOF-MS 技术可以准确筛选食管癌血清差异表达蛋白,建立的诊断模型准确性高,特异性好。

参考文献:

[1] Chen L, Huang XJ, Sun Y. Endoscopic diagnosis of early esophageal carcinoma [J]. World Chinese Journal of Digestology, 2016, 24(1): 51-58. [陈鹭, 黄晓俊, 孙洋. 早期食管癌的内镜诊断进展[J]. 世界华人消化杂志, 2016, 24

- (1):51-58.]
- [2] Okamoto K, Matsui S, Watanabe T, et al. Clinical analysis of esophageal stricture in patients treated with intralesional triamcinolone injection after endoscopic submucosal dissection for superficial esophageal cancer[J]. *Oncology*, 2017, 93 Suppl 1:9-14.
- [3] Shen H, Yang X, Fu PF. To Evaluate the combined detection of multiple tumor markers in early diagnosis of esophageal cancer[J]. *Journal of Clinical Research*, 2005, 22(2):186-188.[沈华, 杨霞, 付佩芬. 多种肿瘤标志物联合检测在食管癌早期诊断中的价值[J]. *医学临床研究*, 2005, 22(2):186-188.]
- [4] Shi H. Diagnostic value of combined detection of four tumor markers for esophageal cancer[J]. *Journal of Radioimmunology*, 2011, 24(4):405.[施华. 四种肿瘤标志物联合检测对食管癌的诊断价值[J]. *放射免疫学杂志*, 2011, 24(4):405.]
- [5] Maher SG, McDowell DT, Collins BC, et al. Serum proteomic profiling reveals that pretreatment complement protein levels are predictive of esophageal cancer patient response to neoadjuvant chemoradiation[J]. *Ann Surg*, 2011, 254(5):809-816.
- [6] Jiang QL, Shen SS, Zhang Y, et al. Progress in the diagnosis and treatment of early esophageal cancer[J]. *Jilin Medical Journal*, 2012, 33(29):6403-6405.[姜庆玲, 沈双双, 张扬, 等. 早期食管癌诊断与治疗进展[J]. *吉林医学*, 2012, 33(29):6403-6405.]
- [7] Ceng HY, Yuan SH, Meng X, et al. Prevention and treatments of esophageal perforation during or after radiotherapy in esophageal carcinoma: a review of literature[J]. *Chinese Journal of Cancer Prevention and Control*, 2017, 24(7): 501-506.[曾海燕, 袁双虎, 孟雪, 等. 食管癌放疗穿孔防治研究进展 [J]. *中华肿瘤防治杂志*, 2017, 24(7): 501-506.]
- [8] Chen W, Zhou SL. The value of DWI in the quantitative and staging evaluation of esophageal cancer [J]. *Journal of Clinical Radiology*, 2014, 33(3): 388-393.[陈伟, 周胜利. DWI 在食管癌定量及定期诊断中的价值[J]. *临床放射学杂志*, 2014, 33(3):388-393.]
- [9] Sun J, Yuan X, Li X, et al. Comparative transcriptome analysis of the global circular RNAs expression profiles between SHEE and SHEEC cell lines [J]. *Am J Transl Res*, 2017, 9(11):5169-5179.
- [10] Martins C, Sousa P, Araújo T, et al. Mediastinal mass in a patient with colorectal cancer: a diagnostic challenge[J]. *GE Port J Gastroenterol*, 2017, 24(4): 193-197.
- [11] Yun XX, Yang JC, Jiang W, et al. Screening for differential proteins of cell nuclear among breast cancer[J]. *Modern Preventive Medicine*, 2012, 39 (24):6442-6445.[韵雪, 杨永长, 姜伟, 等. 乳腺癌细胞核差异蛋白筛选[J]. *现代预防医学*, 2012, 39(24):6442-6445.]
- [12] Chen R, Shi Y, Peng JQ, et al. Analysis on proteome among cervical cancer patients of Uighur nationality in Xinjiang [J]. *Maternal & Child Health Care of China*, 2013, 28(6):1013-1015.[陈锐, 石瑛, 彭靖淇, 等. 新疆维吾尔族宫颈癌蛋白质组图谱分析 [J]. *中国妇幼保健*, 2013, 28(6):1013-1015.]
- [13] Liu CZ, Zhu PY, Shi MX, et al. Screening of serum proteome biomarker of esophageal squamous cell carcinoma by WCX2 protein chip [J]. *China Oncology*, 2007, 17(9): 701-705.[刘茶珍, 朱佩云, 施民新, 等. WCX2 蛋白芯片筛选食管鳞癌血清标志蛋白的研究[J]. *中国癌症杂志*, 2007, 17(9):701-705.]
- [14] Zheng GB, Gao CF, Wang XL, et al. Study on serum proteomic features in patients with and without recurrence or metastasis after surgical resection of esophageal carcinoma [J]. *Genet Mol Res*, 2014, 13(1):538-545.
- [15] Liu CZ, Zhu PY, Shi MX, et al. Serum proteomic spectra of esophageal squamous cell carcinoma patients analyzed with IMAC3 protein chip [J]. *Chinese Journal of Cancer*, 2008, 27(3):272-278.[刘茶珍, 朱佩云, 施民新, 等. 应用 IMAC3 蛋白芯片分析食管鳞癌患者血清蛋白质谱的变化[J]. *癌症*, 2008, 27(3):272-278.]